


Les Oiseaux

Fiche technique

Le cordon Bleu

Nom scientifique	Uraeginthus Cyanocephalus, Uraeginthus bengalus
Origines	Les cordons bleus sont originaires d'Afrique équatoriale et d'Afrique de l'Est. Ils y vivent en couple ou en groupes de quelques individus dans les zones semi-arides.
Taille adulte	12 cm
Variété	le Cordon Bleu de l'Angola, le Cordon Bleu à joues rouges, le blue cap, le Cordon Bleu grenadin et le Cordon Bleu violacé
Longévité	5 à 8 ans
Dimorphisme sexuel	Les femelles sont plus ternes que les mâles et présentent une plus petite partie de bleu comparativement au brun.
Chant  AA	Chant doux et mélodieux
Reproduction	Ils doivent être logés par couples dans une grande cage (100x50x50 cm minimum pour un couple) ou en groupe de la même espèce dans une volière spacieuse, disposant de nombreuses cachettes, leur permettant de construire leur nid au calme. La reproduction est généralement facile à condition que les oiseaux soient au calme et disposent d'un espace suffisant, d'une nourriture variée (mélange de graines, graines germées, millet en grappe, insectes vivants indispensables durant la période de reproduction, pâtée). La femelle pond de 3 à 7 oeufs, les parents se relaient pour couvrir et l'incubation dure de 15 à 17 jours. Les jeunes quittent le nid vers 3 semaines et sont sevrés vers 6 semaines. Le dimorphisme sexuel apparait vers 5 mois.
Comportement social	Le cordon bleu est un oiseau vif qui peut cohabiter avec d'autres petits oiseaux exotiques. Les petites espèces de cordons bleus peuvent cohabiter s'il y a assez d'espace.
Nourriture	Les cordons bleus sont insectivores et granivores. Un mélange pour pinsons leur convient très bien, compléter par un peu d'aliments pour insectivores (vers de farine, petits insectes, pâtée pour insectivores...) et du millet en branche aussi vous pouvez leur donner des légumes et fruits frais. Ils doivent être donnés en petite quantité, lavés, séchés, à température ambiante et retirés dès qu'ils perdent leur fraîcheur. On peut aussi mettre des vitamines dans l'eau de boisson, notamment en période de maladie, de stress, de mue ou de reproduction.
Supplément	Os de seiche et vitamine (prime)
Particularités	
Autres besoins	
A éviter	Les courants d'air!
Items nécessaires	Cage, bain, os de seiche, bloc minérale, substrat (rafle de maïs), perchoirs différents, Supplément de vitamine, millet, jouets.



5 bja UYfjY6 ci hēi YXf5 bja Uf l '8fi a a cbX
 - +) žVci `Yj UfX' Gh>cgYd\ "
 8 fi a a cbXj j`Y
 , % '(+(' %8q)`

BOUTIQUE
 d'ANIMAUX

J jgjhYn' bclfY' gjhY' k YV

k k k 'Vci hēi YXUbja Uf l Xfi a a cbX'Wta`